Вакцинация против гриппа.

Ежегодно гриппом болеют 30-40% дошкольников и школьников (в 3-4 раза чаще взрослых). Грипп очень часто вызывает осложнения, в особенности у детей с хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Существую гипертоксические формы гриппа у детей, приводящие к следующим осложнениям :

1. Поражение ЦНС;
2. Геморрагический синдром – кровоизлияния в различные органы, в т.ч. головной мозг;
3. Синдром Рея – токсическая энцефалопатия с жировой дегенерацией печени;
4. Синдром Гассера – ГУС (острая почечная недостаточность с гемолитической анемией и тромбоцитопенией);
5. Синдром Киша – острая коронарная недостаточность;
6. Синдром Уотерхауза – Фридериксена (острая недостаточность коры надпочечников).

Вакцинацию против гриппа можно проводить с 6 – месячного возраста. противогриппозные вакцины делятся :

-на **живые,** содержащие ослабленные вирусы (Вакцина гриппозная аллантоисная интраназальная живая сухая, для детей от 3 лет и старше);

-**инактивированные вакцины**, не содержащие целые вирусы (Инфлювак, Ваксигрип, Флюарикс, Гриппол, для детей с 6 месяцев, Гриппол Нео, Гриппол плюс – с 3 лет).

Рекомендуется прививать детей от гриппа осенью, до начала эпидемии.

Детям, прививаемым впервые и не болевшим гриппом, рекомендуется вводить 2 дозы противогриппозной вакцины с интервалом в 4 недели, в последующие годы – однократно. Инактивированные сплит и субъединичные вакуцины совместимы с другими вакцинами, их введение с пневмококковыми (Пневмо 23, Превыенар) и Хиб вакцинами сокращает респираторную заболеваемость.